



Gene Polymorphism of BCG Vaccine Strains Using in Iran

ARTICLE INFO

Article Type

Research Article

Authors

Fallah F.¹ PhD,
Goudarzi H.² PhD,
Doustdar F.² PhD,
Zahraei S. M.³ PhD,
Mohammadzadeh A. R.* MSc

ABSTRACT

Aims The Bacille Calmette-Guérin (BCG) is the only vaccine available against tuberculosis. The BCG strain used in Iran as the vaccine is not specified. The purpose of the present study was to confirm and make a qualitative control for BCG vaccine in Iran and to determine the genetic polymorphism of the given strain.

Methods Twenty eight lyophilized BCG vaccines (Pasteur Institute, Iran) with different batch numbers were collected over a year (2011-12) and transferred under the temperature condition of 4°C to the laboratory. Three strains of vaccine were selected randomly out of each batch number. The DNA was extracted using CTAB method. DNA samples were kept at -20°C. Of four primers, RD14 and DU1 genes were used for PCR. The sequence of RD16 region in BCG strains was determined using DNA analyzer ABI3730XL using Chromas and Mega4 software. VNTR typing was done for six genic positions.

Results All strains were positive in terms of their culture on the medium. In all BCG strains under study, DU1 duplication in the bacteria's chromosome was observed. None of strains had RD14 gene. All RD16 regions had similar sequence with RD16 region in the genome of Pasteur 1173p2 strain. The number and size of repeated units for six gene positions including MIRU4, MIRU24, MIRU26, MIRU40, VNTR1895 and VNTR11b in 28 strains of different BCG in the vaccine samples were respectively (2×77)+122, (2×54)+393, (5×51)+285, (2×54)+354, (4×57)+281 and (3×69)+67.

Conclusion BCG strain using in Iran is the very Pasteur 1173p2 and may be used as vaccine.

Keywords BCG Vaccine; Polymorphism, Genetic; Polymerase Chain Reaction; MIRU-VNTR Typing

*Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

¹Department of Microbiology, Faculty of Medicine" & "Pediatric Infections Research Center", Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

²Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

³Contagious Diseases Management Center, Ministry of Health, Care & Medical Education, Tehran, Iran.

CITATION LINKS

- [1] BCG-different strains, different ... [2] History of *Bacillus calmette-guerin* and bladder cancer: An... [3] Comparative genomics of BCG ... [4] Loss of RD1 contributed to the attenuation of the live tuberculosis vaccines ... [5] Identification of substrains of BCG vaccine using multiplex ... [6] Comparative genomics of BCG vaccines by ... [7] Genome plasticity of BCG and impact on ... [8] WHO discussion on the improvement of... [9] Specific differentiation between *Mycobacterium bovis* BCG and ... [10] Evaluation of Variable Number Tandem Repeat (VNTR) ... [11] BCG vaccine, freeze ... [12] Requirements for dried BCG ... [13] Report of an international collaborative study to... [14] Multiplex PCR-identified cutaneous tuberculosis ... [15] BCG osteomyelitis caused by the BCG Tokyo strain ... [16] PCR identification of *Mycobacterium bovis* ... [17] Utility of fast mycobacterial interspersed repetitive unit-variable number tandem repeat genotyping... [18] Mapping the global use of different ... [19] Short protocols in molecular ... [20] Extraction of *Mycobacterium tuberculosis* ... [21] Proposal for standardization of optimized mycobacterial interspersed... [22] Global TB database. [23] Epidemiology of tuberculosis in the... [24] BCG vaccines: Their mechanisms of attenuation and .. [25] BCG vaccine. [26] Comparative genomics uncovers large tandem ... [27] Variable-number tandem repeat typing of *Mycobacterium tuberculosis* isolates with low copy numbers of IS6110 by using ... [28] MIRU-VNTR typing adds discriminatory value to groups of *Mycobacterium*... [29] Genetic composition of *Mycobacterium* ...

Correspondence

Address: Microbiology Department, Medical Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Koodakyan Street, Daneshgah Boulevard, Velenjak, Tehran, Iran.
Phone: +985357225027
Fax: +985357223914
alm13604@gmail.com

Article History

Received: September 19, 2012
Accepted: March 4, 2013
ePublished: March 10, 2013

پلی‌مورفیسم ژنی سویه واکسن BCG مورد استفاده در ایران

فاطمه فلاح PhD

"گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی" و "مرکز تحقیقات عفونی اطفال"، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

حسین گودرزی PhD

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فرحناش دوستدار PhD

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سید محسن زهراei PhD

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

علیرضا محمدزاده* MSc

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: باسیل کالمت-گرین (BCG) تنها واکسن در دسترس علیه بیماری سل است. سویه BCG مورد استفاده به عنوان واکسن در ایران نامشخص است. هدف این مطالعه تایید و کنترل کیفی واکسن BCG مورد استفاده در ایران و تعیین پلی‌مورفیسم ژنی این سویه بود.

روش‌ها: ۲۸ واکسن BCG لیوفلیره (انسیتو پاستور؛ ایران) با شماره سریال‌های متفاوت طی یک سال (۱۳۹۰-۹۱) جمع‌آوری و تحت شرایط دمایی 4°C به آزمایشگاه انتقال داده شدند. از هر شماره سریال ۳ سویه واکسن بهصورت تصادفی انتخاب شد. استخراج DNA با روش CTAB در دمای 20°C - 20°C -نگهداری شدند. از ۴ پرایم برای PCR ژن‌های RD14 و DU1 استفاده شد. تعیین توالی ژن‌های RD16 در سویه‌های واکسن BCG توسط آنالایزر ABI3730XL با نرم‌افزارهای Chromas 4 و Mega 4 انجام شد. تعیین VNTR تایپینگ برای ۶ جایگاه ژنی صورت گرفت.

یافته‌ها: تمام سویه‌ها از نظر کشت روحی محیط مثبت بودند. در همه سویه‌های BCG مورد بررسی مضاعفشدگی DU1 در کروموزوم باکتری‌ها مشاهده شد. هیچ‌کدام از سویه‌ها دارای ژن RD14 نبودند. همه نواحی RD16 دارای توالی مشابه با ناحیه RD16 در ژنوم سویه ژنی باشند. تعداد و اندازه واحدهای تکراری برای ۶ جایگاه Pasture1173p2 VNTR1895، MIRU40، MIRU26، MIRU24، MIRU4، MIRU2، MIRU1b در ۲۸ سویه BCG مختلف در نمونه‌های واکسن و VNTR11b بهترتبه $(2 \times 77) + (2 \times 54) + (2 \times 53) + (2 \times 54) + (2 \times 54) + (2 \times 54)$ و $(4 \times 57) + (2 \times 54) + (2 \times 54) + (2 \times 54) + (2 \times 54) + (2 \times 54)$ بود.

نتیجه‌گیری: سویه BCG مورد استفاده در ایران، همان سویه Pasture1173p2 است و می‌توان از آن به عنوان واکسن استفاده نمود.

کلیدوازه‌ها: واکسن BCG، MIRU-VNTR، تایپینگ، پلی‌مورفیسم ژنی، واکشن پلی‌مرازی زنجیره‌ای

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

*نویسنده مسئول: alm13604@gmail.com

بیماری سل یکی از بیماری‌های مهم و رو به گسترش در دنیا است؛ بهطوری که تخمین زده می‌شود در هر سال، ۸میلیون نفر به مبتلایان افزوده شده و ۲میلیون نفر از این بیماری بمیرند. همچنین، یک‌سوم جمعیت جهان به مایکوبکتریوم توبرکلوزیس مبتلا هستند [۱]. یکی از راه‌های کنترل بیماری سل، استفاده از واکسن باسیل کالمت-گرین (BCG) است. این واکسن سویه ضعیف‌شده مایکوبکتریوم بویس است که پس از پاساژهای متوالی (۲۳۱) پاساژ طی ۱۳ سال) توسط کالمت و گرین در انیستیتو پاستور فرانسه تولید شد [۲].

طی سال‌های ۱۹۰۸-۶۱، پاساژهای مکرر واکسن باعث ایجاد زیرسویه‌های مختلف شد که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت بودند [۳]. در پاساژهای مکرر BCG از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۲۱ توسط کالمت و گرین، ناحیه RD1 از DNA گونه بیماری‌زای مایکوبکتریوم بویس حذف شد که نتیجه آن ایجاد سویه ضعیف‌شده BCG بود [۴]. حذف ناحیه RD2 طی ۱۹۲۷-۳۱ اتفاق افتاد و به دنبال این حذف در سال ۱۹۳۸ ناحیه RD14 طی پاساژهای مکرر از سویه BCG "Pasture1173p2" حذف شد. این سویه تنها سویه فاقد ناحیه RD14 است [۳، ۵، ۶]. بنابراین از این خصوصیت می‌توان برای تشخیص و افتراق آن از سایر سویه‌های BCG استفاده نمود. به غیر از حذف‌هایی که در DNA BCG رخداد، ۳ مضاعفشدگی طی سال‌های ۱۹۲۱-۶۱ نیز صورت گرفت. مضاعفشدگی DU1 فقط در کروموزوم سویه BCG پاستور وجود دارد و می‌توان از این ویژگی در تشخیص آن استفاده کرد [۳، ۷]. علاوه بر تغییرات ژنتیکی یادشده، توالی‌های VNTR در BCG وجود دارد که می‌توان از آنها برای تفرقی زیرسویه‌های آن استفاده کرد. حدود ۴۰ واحد MIRU در ژنوم مایکوبکتریوم توبرکلوزیس وجود دارد که ۱۲ واحد آن دارای اهمیت بیشتری هستند. یکی از واحدهای تکراری مهم در BCG، در ناحیه MIRU4 قرار دارد. این ناحیه دارای یک توالی تکراری ۷۷ جفت‌بازی است که این توالی در جایگاه ژنی MIRU4 با توجه به نوع زیرسویه BCG حاوی ۱ (Prague BCG) ۲ (Pasture1173p2) یا ۳ (Merieux BCG) تکرار است [۸، ۹]. علاوه بر MIRU4، واحدهای تکراری دیگری هم در سویه‌های مختلف BCG وجود دارند که از این واحدهای تکراری می‌توان در افتراق سویه‌های BCG استفاده نمود [۱۰].

شرایط مختلف پاساژ واکسن BCG در آزمایشگاه‌های مختلف در سراسر دنیا در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۲۱ منجر به ظهور سویه‌های BCG مختلف با تغییرات ژنتیکی شامل حذف‌ها، مضاعفشدگی‌ها و چهش‌های نقطه‌ای شد [۳]. این تغییرات ژنتیکی می‌تواند این‌زایی واکسن BCG را تحت تاثیر قرار دهد؛ بهطوری که سیستم ایمنی بدن پاسخ مناسبی به واکسن ندهد. از این‌رو، ارزیابی

استخراج DNA: با روش CTAB انجام شد [۱۹، ۲۰]. تقریباً 2×10^9 CFU از سویه باکتری در یک میلی لیتر بافر تریس-۷/۵ pH با EDTA در دمای 37°C آنزیم لیزوژیم حل و بهمدت ۲۴ ساعت در دمای 37°C گرمخانه گذاری شد. پس از اضافه کردن 10 mg/ml SDS و $10\text{ %} / \text{ml}$ مخلوط بهمدت یک شب در دمای 65°C قرار داده شد. 5 Molar به $100\text{ }\mu\text{l}$ از محلول CTAB اضافه شد و بهمدت ۱۰ دقیقه در 65°C قرار گرفت. پس مخلوط با افزودن کلروفرم/ایزوامیل الکل در $1200\text{ }\mu\text{g}$ بهمدت ۱۵ دقیقه سانتریفوج شد. مایع رویی به یک میکروتیوب جدید منتقل و $450\text{ }\mu\text{l}$ ایزوفیروپانول اضافه شد تا رسوپ کند. نمونه یک شب در -20°C -قرار گرفت و DNA رسوپ کرده توسط میکروسانتریفوج در $1200\text{ }\mu\text{l}$ برای ۱۵ دقیقه، با اتانول 70 % شسته و در $50\text{ }\mu\text{l}$ بافر TE حل شد. نمونه های DNA در دمای -20°C -نگهداری شدند.

ژن های PCR و RD14 و DU1: در این روش از ۴ پرایمر برای RD14 [۶] و DU1 [۷] استفاده شد. برنامه PCR و سایر شرایط تکثیر مشابه مطالعه بدewal و همکاران بود [۵]. PCR برای هر ژن، در حجم $30\text{ }\mu\text{l}$ با 100 ng DNA , 1 mM MgCl_2 , 1 mM dNTP , $0.4\text{ mM}\cdot/2\text{ }\mu\text{M}$ dNTP بهمدت ۱۰ دقیقه، 94°C چرخه در 94°C بهمدت ۱ دقیقه، 30°C بهمدت ۱ دقیقه، 72°C بهمدت ۲ دقیقه و یک چرخه در 55°C بهمدت ۱ دقیقه و 72°C بهمدت ۱۰ دقیقه بود. محصولات PCR توسط الکتروفورز افقی و ژل آگارز $1/5\text{ %}$ با نرdban DNA ۱۰۰ جفت بازی به عنوان نشانگر در بافر تریس-بوریک اسید-EDTA آنالیز شدند. نتایج PCR بعد از رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید با کمک UV ترانس لومیناتور بررسی شدند.

تعیین توالی DNA: تعیین توالی ناحیه RD16 در سویه های واکسن BCG صورت گرفت. برای آماده سازی DNA ناحیه RD16 برای تعیین توالی، این ناحیه با کمک پرایمرهای اختصاصی [۶] و با روش PCR مشابه حالت مربوط به ناحیه RD14 تکثیر شد. تعیین توالی ناحیه RD16 توسط آنالایزر DNA (Bioneer ABI3730XL: کره جنوبی) انجام شد و توالی ها با نرم افزارهای Chromas و ۴ آنالایز شدند.

VNTR تایپینگ: در این روش از ژن های MIRU4, MIRU1895, MIRU24, MIRU26, MIRU40 و VNTR11b استفاده شد. پرایمرهای VNTR-PCR به کاررفته مشابه پرایمرهای بیان شده توسط سوپلای و همکاران بود [۲۱]. PCR ژن های مورد نظر به صورت یک چرخه در 94°C بهمدت ۴ دقیقه، 30°C چرخه ترکیبی (94°C بهمدت ۳۰ ثانیه، دمای آنیلینگ برای ژن ها متفاوت بهمدت ۳۰ ثانیه و 72°C بهمدت ۳۰ ثانیه) و یک چرخه در 72°C بهمدت ۵ دقیقه بود (دمای آنیلینگ برای

تغییرات ژنتیکی سویه های مختلف BCG در دوره های زمانی داری اهمیت زیادی است. برای این منظور، روش هایی برای کنترل واکسن توسط سازمان جهانی بهداشت [۱۱] و سازمان دارویی اروپا (PhEur) [۱۲] توصیه شده است. این روش ها شامل بررسی میکروسکوپی باسیل ها در اسپر رنگ آمیزی شده توسط رنگ آمیزی ذیل - نلسون (بیان خصوصیت اسید فست بودن باکتری) و تعیین خصوصیات ظاهری کلی های رشدیافتہ در محیط جامد هستند که فقط حضور باسیل در واکسن BCG را تایید نموده و دارای ویژگی اختصاصی بالایی برای BCG نیستند و با کمک این روش ها امکان افتراق سویه های BCG و دیگر اعضای گونه مایکروبکتریوم BCG توبرکلوزیس وجود ندارد [۵، ۱۳]. برای افتراق سویه های BCG استفاده از تکنیک های مبتنی بر تکثیر اسیدونوکلئیک مفید است و می توان از روش های مولکولی مختلف برای افتراق سویه های BCG استفاده نمود [۱۳]. روش های مولکولی مورد استفاده برای تمایز زیرسویه های BCG، معمولاً روش هایی مبتنی بر PCR (Tایپینگ VNTR یا Multiplex PCR) هستند [۵، ۱۰-۱۶]. به طور کلی و با توجه به موارد بیان شده در بالا می توان الگوی ژنتیکی زیرسویه های BCG را بر اساس نواحی RD، الگوی MIRU-VNTR و DU تعریف نمود [۸]. روش VNTRs تایپینگ، ممکن است در این روش با کمک پرایمرهای اختصاصی، جایگاه های ژنی تکراری تکثیر شده و اندازه محصول PCR که نشان دهنده تعداد تکرارهای تصادفی در هر جایگاه ژنی است، مشخص می شود [۱۷].

با توجه به معرض بیماری سل در ایران و افزایش مقاومت چند دارویی سویه های مایکروبکتریوم توبرکلوزیس و ایجاد سویه های با مقاومت دارویی وسیع، استفاده از واکسن BCG نیازی نمی باشد و کنترل کیفی واکسن ها برای اطمینان از کفاایت اینمی زایی BCG از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، نتایج مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت نشان می دهد که سویه BCG مورد استفاده در ایران، سویه ای نامشخص است [۱۸]. از این رو، هدف این مطالعه تایید و کنترل کیفی واکسن BCG مورد استفاده در ایران و تعیین پلیمورفیسم ژنی این سویه بود.

روش ها

باکتری ها: ۲۸ واکسن BCG لیوفلیزه (انیستیتو پاستور؛ ایران) با شماره سریال های متفاوت (۸۸۱، ۸۹۵۵، ۸۹۶۲، ۸۹۶۱، ۸۹۷۵، ۹۳۱۴، ۹۳۱۳، ۹۳۱۲، ۹۳۲۱، ۹۳۲۲، ۹۳۷۳، ۹۴۴۴، ۹۴۶۲، ۹۴۶۳، ۹۴۶۴، ۹۴۶۵، ۹۴۶۶، ۹۴۶۷، ۹۴۶۸، ۹۴۶۹ و ۹۴۷۰) طی یک سال (۱۳۹۰-۹۱) جمع آوری و تحت شرایط دمایی 40°C به آزمایشگاه انتقال داده شدند. از هر شماره سریال ۳ سویه واکسن به صورت تصادفی انتخاب شد.

تعداد و اندازه واحدهای تکراری برای ۶ جایگاه ژنی MIRU4، MIRU24، MIRU40، MIRU26، VNTR1895 و VNTR11b در ۲۸ سویه BCG مختلف در نمونههای واکسن بهترتیب $(+122)$ ، $(+293)$ ، $(+285)$ ، $(+281)$ ، $(+280)$ و $(+287)$ بود.


۵۵/۶°C MIUR40، ۵۵/۶°C MIUR4، ۵۶/۱°C VNTR11b و ۵۶/۸°C VNTR1895 و ۶۶/۷°C PCR توسط آگارز ژل الکتروفورز و سپس UV لومیناتور آنالیز شدند.

بحث

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که در این سال میزان بروز بیماری سل ۷/۸ میلیون مورد بوده و طی این سال یک میلیون مورد مرگ به دلیل بیماری سل بین افرادی که مبتلا به HIV نبودند و ۰/۹۳ میلیون مورد مرگ در افرادی که به طور همزمان به سل و HIV مبتلا بودند، رخ داده است [۲۲]. شیوع بیماری سل براساس مناطق جغرافیایی متغیر است و در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، میزان بروز این بیماری نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشتر است [۲۲]. در ایران بروز بیماری سل در نواحی مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در منطقه جنوب شرقی ایران ۱۳۲ مورد در هر یک میلیون نفر گزارش شده است [۲۳]. هم‌مرزبودن ایران با افغانستان، پاکستان و عراق دلیلی عمده برای بالابودن میزان بیماری سل بهخصوص در مناطق مرزی است.

گسترش جهانی سویه‌های مايكوباكتریوم توبرکولوزیس با مقاومت چندارویی و سویه‌های با مقاومت دارویی وسیع و همچنین عفونت همزمان مايكوباكتریوم توبرکولوزیس با HIV در بسیاری از بخش‌های دنیا، نیاز مبرم به کنترل بیماری سل را می‌طلبد [۱، ۲۴]. واکسن BCG (حاوی سویه ضعیفی‌شده مايكوباكتریوم بویس) تنها واکسن در دسترس علیه بیماری سل است [۲۴] و از سال ۱۹۲۱ این واکسن برای میلیاردها نفر استفاده شد [۱]. تحقیق‌زده شده که بیش از ۳ میلیارد نفر با واکسن BCG ایمن شده‌اند و بیش از ۱۰۰ میلیون دوز از این واکسن هرساله مورد استفاده قرار می‌گیرد [۲۵]. طبق یک گزارش، در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از یک سویه BCG به عنوان واکسن استفاده می‌شود. از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای با شیوع بالای بیماری سل، واکسن توسط یونیسف/سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه جهانی برای واکسن‌ها و ایمنی‌زایی تامین می‌شود. با توجه به این مطالعه، ایران از یک سویه BCG تولیدشده در داخل استفاده نموده که نوع این سویه BCG مشخص نیست [۱۸].

با توجه به نتایج این بررسی، ناحیه حذفی RD14 در هیچ یک از سویه‌های مورد مطالعه وجود نداشتند. از طرف دیگر سویه RD14 تنها زیرسویه‌ای است که قادر ناحیه Pasture1173p2 بوده و توسط این خصوصیت از سایر سویه‌های BCG قابل افتراء است [۵، ۶]. بنابراین با توجه به این مطلب، تمام سویه‌های این مطالعه به عنوان سویه‌های Pasture1173p2 تشخیص داده



شکل ۱) PCR ژن DU1 در سویه‌های BCG. ۱ تا ۵ سویه‌های BCG با شماره سریال‌های مختلف؛ L: نشانگر ۱۰۰ جفت‌بازی

نتایج

تمام سویه‌ها از نظر کشت روی محیط مثبت بودند. همه سویه‌های BCG مورد بررسی یک محصول ۴۰۰ bp داشتند که نشان‌دهنده حضور ناحیه مضاعف‌شده DU1 در کروموزوم باکتری‌ها بود (شکل ۱). هیچکدام از سویه‌ها دارای باند ۲۵۵ bp که مشخص کننده حضور ژن RD14 است، نبودند (شکل ۲). تعیین توالی ناحیه RD16 در سویه‌های واکسن BCG نشان داد که همه نواحی RD16 دارای توالی مشابه با ناحیه RD16 در ژنوم سویه Pasture1173p2 بودند.



شکل ۲) PCR ژن RD14 در سویه‌های BCG. ۱ تا ۴ سویه‌های BCG با شماره سریال‌های مختلف؛ L: نشانگر ۱۰۰ جفت‌بازی

نتیجه‌گیری

سویه BCG مورد استفاده در ایران، همان سویه Pasture1173p2 است و می‌توان از آن به عنوان واکسن استفاده نمود.

تشکر و قدردانی: نویسندها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین آقایان صدرایی و زمانی که در تهیه واکسن‌های BCG نقش بسزایی داشتند، اعلام می‌دارند.

منابع

- 1- Behr MA. BCG-different strains, different vaccines. *Lancet Infect Dis.* 2002;2(2):86-92.
- 2- Herr H, Morales A. History of Bacillus calmette-guerin and bladder cancer: An immunotherapy success story. *J Urol.* 2008;179:53-6.
- 3- Behr MA. Comparative genomics of BCG vaccines. *Tuberculosis.* 2001;81(1/2):165-8.
- 4- Pym A, Brodin P, Brosch R, Huerre M, Cole S. Loss of RD1 contributed to the attenuation of the live tuberculosis vaccines *Mycobacterium bovis* BCG and *Mycobacterium microti*. *Mol Microbiol.* 2002;46(3):709-17.
- 5- Bedwell J, Kairo SK, Behr MA, Bygrave JA. Identification of substrains of BCG vaccine using multiplex PCR. *Vaccine.* 2001;19:2146-51.
- 6- Behr MA, Wilson MA, Gill WP, Salamon H, Schoolnik GK, Rane S, et al. Comparative genomics of BCG vaccines by whole-genome DNA microarray. *Science.* 1999;284:1520-3.
- 7- Brosch R, Gordon S, Garnier T, Eiglmeier K, Frigui W, Valenti P, et al. Genome plasticity of BCG and impact on vaccine efficacy. *Proc Natl Acad Sci.* 2007;104(13):5596-601.
- 8- Knezevic I, Corbel MJ. WHO discussion on the improvement of the quality control of BCG vaccines. Pasteur Institute, Paris, France, 7 June 2005 (Meeting report). *Vaccine.* 2006;24(18):3874-7.
- 9- Magdalena J, Supply P, Locht C. Specific differentiation between *Mycobacterium bovis* BCG and virulent strains of the *Mycobacterium tuberculosis* complex. *J Clin Microbiol.* 1998;36(9):2471-6.
- 10- Roring S, Scott AN, Hewinson RG, Neill SD, Skuce RA. Evaluation of Variable Number Tandem Repeat (VNTR) loci in molecular typing of *Mycobacterium bovis* isolates from Ireland. *Vet Microbiol.* 2004;101(1):65-73.
- 11- European Pharmacopoeia Commission. BCG vaccine, freeze dried. European pharmacopoeia. 6th ed. Strasbourg: Council of Europe; 2008.
- 12- Donikian R, Gheorghiu M, Jablakova TB. Requirements for dried BCG vaccine. WHO Tech Rep Ser. 1987;60-92
- 13- Markey K, Hoa MM, Choudhury B, Sekib M, Juc L, Castello-Branco L RR, et al. Report of an international collaborative study to evaluate the suitability of multiplex PCR as an identity assay for different sub-strains of BCG vaccine. *Vaccine.* 2010;28:6964-9.
- 14- Okazaki T, Ebihara S, Takahashi H, Asada M, Sato A, Seki M, et al. Multiplex PCR-identified cutaneous

شدند. همچنین در این مطالعه، نتایج PCR ناحیه مضاعف شدگی DU1 نمونه‌های BCG مشخص نمود که تمام نمونه‌ها دارای این ناحیه هستند و مطالعات مختلف نشان می‌دهند سویه Pasture1173p2 تنها سویه بین سویه‌های BCG است که دارای ناحیه DU1 است [۷، ۸، ۲۶]. این مطلب با نتایج ما همخوانی داشته و بنابراین سویه‌های مورد بررسی سویه‌های Pasture1173p2 BCG هستند.

در بسیاری از مطالعاتی که صورت گرفته از روش MIRU-VNTR تایپینگ به عنوان روش تایپینگ مولکولی قابل اعتماد و مناسب برای افتراق ایزووله‌های مختلف مایکوبکتریوم‌های کلینیکی استفاده شده است. در برخی از این مطالعات با کمک این روش و بر اساس ۱۲ جایگاه زنی حاوی VNTR، نمونه‌های مایکوبکتریوم توپرکلوزیس زنوتایپینگ شده‌اند [۲۷، ۲۱]. در مطالعات دیگری که انجام گرفته، از روش MIRU-VNTR تایپینگ برای تعیین الگوی مولکولی نمونه‌های مایکوبکتریوم بوسیس با استفاده از جایگاه‌های زنی مختلف VNTR استفاده شده است [۲۸، ۱۰] و باید توجه داشت که باکتری BCG در حقیقت سویه ضعیف شده مایکوبکتریوم بوسیس بوده و توالی ژنوم این دو باکتری مشابه هم است. در مطالعه‌ای که توسط استفانووا و همکاران صورت گرفت، پروفایل VNTR سویه Sofia براساس ۶ جایگاه زنی VNTR تعیین شد [۲۹].

طی این مطالعه، ۶ جایگاه زنی VNTR در نمونه‌های واکسن BCG بررسی شد و الگوی VNTR به صورت ۲-۲-۳-۴-۲-۲ بود. یکی از توالی‌های تکراری مهمی که در کروموزوم ۵ بود، یکی از توالی‌های تکراری مهمنی که در کروموزوم BCG وجود داشته و برای افتراق سویه‌های مختلف BCG از یکدیگر استفاده می‌شود، در ناحیه MIRU4 قرار داشته و تعداد تکرار این توالی ۷۷ جفت‌بازی در سویه‌های مختلف BCG متفاوت است. با توجه به یافته‌های این مطالعه تعداد تکرار این توالی در همه سویه‌های مورد مطالعه ۲ بود و سویه 2 Pasture1173p2 سویه‌ای است که دارای ۲ تکرار از این توالی است و این نتیجه با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد [۸، ۲۶]. همچنین الگوی سایر نواحی VNTR در واکسن‌های مورد بررسی مشابه نتایج مطالعات دیگر بوده و الگوی VNTR به دست آمده در این مطالعه با الگوی سویه Pasture1173p2 یکسان است [۱۰]. در این مطالعه برای تایید RD16 نهایی سویه مورد استفاده به عنوان واکسن در ایران، ناحیه در ژنوم سویه‌ها تعیین توالی شد و نتایج این تعیین توالی، بیان کننده این مطلب بود که سویه واکسن BCG ایران، همان سویه Pasture1173p2 است.

از جمله مشکلات این مطالعه می‌توان به محدودیت و صرف زمان طولانی در جمع آوری نمونه‌های واکسن BCG (با توجه به اینکه تولید هر واکسن BCG با شماره سریال جدید نیاز به زمان طولانی دارد) اشاره نمود.

- Geneva: World Health Organization; 2012. Available from: http://www.who.int/tb/country/global_tb_database/en/;2012
- 23- Khazaei HA, Rezaei N, Bagheri GhR, Dankoub MA, Shahryari Kh, Tahai A. Epidemiology of tuberculosis in the southeastern Iran. *Eur J Epidemiol.* 2005;20:879-83.
- 24- Liu J, Tran V, Leung A, Alexander D, Zhu B. BCG vaccines: Their mechanisms of attenuation and impact on safety and protective efficacy. *Hum Vac.* 2009;5(2):70-8.
- 25- World Health Organization. BCG vaccine. WHO position paper. *Wkly Epidemiol Rec.* 2004;79:27-38.
- 26- Brosch R, Gordon S, Buchrieser C, Pym A, Garnier T, Cole S. Comparative genomics uncovers large tandem chromosomal duplications in *Mycobacterium bovis* BCG Pasteur. *Yeast.* 2000;17(2):111-23.
- 27- Cowan LS, Mosher L, Diem L, Massey JP, Crawford JT. Variable-number tandem repeat typing of *Mycobacterium tuberculosis* isolates with low copy numbers of IS6110 by using mycobacterial interspersed repetitive units. *J Clin Microbiol.* 2002;40(5):1592-602.
- 28- Duarte E, Domingos M, Amado A, Cunha M, Botelho A. MIRU-VNTR typing adds discriminatory value to groups of *Mycobacterium bovis* and *Mycobacterium caprae* strains defined by spoligotyping. *Vet Microbiol.* 2010;143(2-4):299-306.
- 29- Stefanova T, Chouchkova M, Hinds J, Butcher P, Inwald J, Dale J, et al. Genetic composition of *Mycobacterium bovis* BCG substrain Sofia. *J Clin Microbiol.* 2003;41(11):5349.
- tuberculosis evoked by *Mycobacterium bovis* BCG vaccination in a healthy baby. *J Clin Microbiol.* 2005;43(1):523-5.
- 15- Kim SH, Kim SY, Eun BW, Yoo WJ, Park KU, Choi EH, et al. BCG osteomyelitis caused by the BCG Tokyo strain and confirmed by molecular method. *Vaccine.* 2008;26:4379-81.
- 16- Talbot E, Williams D, Frothingham R. PCR identification of *Mycobacterium bovis* BCG. *J Clin Microbiol.* 1997;35(3):566-9.
- 17- Allix C, Supply P, Fauville-Dufaux M. Utility of fast mycobacterial interspersed repetitive unit-variable number tandem repeat genotyping in clinical mycobacteriological analysis. *Clin Infect Dis.* 2004;39(6):783-9.
- 18- Ritz N, Curtis N. Mapping the global use of different BCG vaccine strains. *Tuberculosis.* 2009;89:248-51.
- 19- Ausubel F, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Smith JA, et al. Short protocols in molecular biology. 5th ed. New York: John Wiley and Sons; 2002.
- 20- Somerville W, Thibert L, Schwartzman K, Behr MA. Extraction of *Mycobacterium tuberculosis* DNA: A question of containment. *J Clin Microbiol.* 2005;43(6):2996-7.
- 21- Supply P, Allix C, Lesjean S, Cardoso-Oleemann M, Rusch-Gerdes S, Willery E. Proposal for standardization of optimized mycobacterial interspersed repetitive unit-variable-number tandem repeat typing of *Mycobacterium tuberculosis*. *J Clin Microbiol.* 2006;44(12):4498-510.
- 22- World Health Organization. Global TB database.