

Comparison the Protective Effects of L-Carnitine and Acetyl L-Carnitine on Blood Glucose and Lipid Peroxidation Level in Diabetic Rats

Hajinezhad M.R.* PhD, Hajian Sh.¹ DVM, Saghayei S.¹ DVM, Samzadeh-Kermani A.R.² PhD, Nabavi R.³ PhD

*Basic Science Department, Veterinary Medicine Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran

¹Basic Science Department, Veterinary Medicine Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran

²Chemistry Department, Basic Science Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran

³Pathobiology Department, Veterinary Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran

Abstract

Aims: New medications with less side-effect are increasingly noticed now a day. L-Carnitine and Acetyl L-Carnitine reduce the secondary side-effects of Type I diabetes. The aim of this study was to investigate the effects of oral administration of the materials on the blood glucose and the lipid per-oxidation of the liver and brain tissues in the diabetic rats.

Materials & Methods: In the experimental study, 50 male Wistar rats were studied. The rats were randomly divided into five groups including control (the healthy rats), negative control (the diabetic rats), and three treatment diabetic groups. The diabetic groups received 110mg/Kg alloxan via injection to become diabetic. The treatment groups received L-Carnitine, Acetyl L-Carnetine, and L-Carnetine with Acetyl L-Carnitine (300mg/Kg) as gavage for 30 days. The lipid per-oxidation, the serum glucose, the lipid profile, and the liver enzymes were measured at the end of the experiment. Data was analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey complementary test.

Findings: The fasting blood concentration, triglyceride, cholesterol, creatinine, the serum liver enzymes, and the level of the liver tissue malondialdehyde significantly decreased in treatment diabetic group than diabetic group without any treatment, while HDL level increased as well ($p<0.05$). The brain tissue malondialdehyde and the serum HDL decreased and increased due to the administration of Acetyl L-Carnitine, respectively. Nevertheless, it affected no other parameter significantly. The positive effects of L-Carnitine were reduced by the administration of Acetyl L-Carnitin with L-Carnitine.

Conclusion: The administration of L-Carnitine further reduces the secondary side-effects of diabetes than Acetyl L-Carnitine. In addition, simultaneous administration of the materials is not recommended.

Keywords

Diabetes Mellitus [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003920>];

L-Carnitine [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002331>];

Acetyl L-Carnitine [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68000108>];

Rats [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68051381>]

* Corresponding Author

Tel: +985422323567

Fax: +985422323567

Address: Basic Science Department, Veterinary Medicine Faculty, University of Zabol, Bonjar Ave, Zabol, Iran. Postal Code: 98613-35856

hajinezhad@uoz.ac.ir

Received: October 24, 2015

Accepted: May 10, 2016

ePublished: June 30, 2016

مقایسه اثر حفاظتی ال- کارنیتین و استیل ال-

کارنیتین بر سطح گلوکز سرم و پراکسیداسیون

لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی

مقدمه

دیابت نوع اول یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون‌ریز است. در این بیماری ترشح انسولین از جزایر بتای پانکراس کاهش یافته و منجر به اختلال در متابولیزم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می‌شود^[1]. امروزه گرایش به‌سوی داروهای جدید که عوارض جانبی کمتری دارند روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ال‌کارنیتین ماده‌ای با ساختار مشابه اسید‌آمینه و عملکرد شبیه ویتامین است. ال‌کارنیتین در بدن از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری و افزایش اکسیداسیون آنها می‌شود. این ماده قادر است فعالیت پیرروات‌دهیدروژنان و کتابولیزم گلوکز را افزایش دهد^[2].

مطالعات انجام‌شده در انسان نشان‌دهنده اثر آنتی‌اکسیدانی قوی ال‌کارنیتین در بافت عضله است. تجویز روزانه ۴ گرم ال‌کارنیتین به وزشکاران به‌مدت دو هفته آسیب عضلانی و پارامترهای استرس اکسیداتیو ناشی از تمرين شدید را کاهش داد. یافته‌های اخیر سبب شده است که برخی محققان استفاده از مکمل ال‌کارنیتین را بهمنظور کندشن فرآیند آتروفی ماهیچه‌ها و جلوگیری از تخریب بافت عضلانی در افراد مسن توصیه کنند^[3]. همچنین به‌نظر می‌رسد که وجود ال‌کارنیتین برای بهبود کارکرد قلب نیاز است. برای نمونه در یک پژوهش میزان کارکرد نایهنجار و تپش غیرعادی قلب بعد از ۴۵ روز مصرف ۴ گرم ال‌کارنیتین در روز در بیماران دیابتی که علاوه بر فشار خون بالا از ناراحتی‌های قلبی و عروقی رنج می‌بردند، بهمیزان چشمگیری کاهش یافت^[4]. در بیماران مبتلا به سلطان، در صورت بروز عوارض قلبی یا خستگی شدید، مصرف روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم کارنیتین به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه شده است^[5].

استیل ال‌کارنیتین ترکیبی مشابه اسیدهای آمینه است که از دو اسید‌آمینه لیزین و متیونین ساخته می‌شود. این ترکیب نقش مهمی در متابولیزم مواد غذایی دارد و به عنوان یک مکمل غذایی کاربرد وسیعی دارد. تجویز خوارکی این ماده توانست استرس اکسیداتیو را در مدل تجربی آزادیم کاهش دهد. همچنین اثر ضدصرعی این ماده در مدل تشنج عمومی ایجاد شده با پتینیل‌ترزاول بررسی شده است. اثر حفاظت عصبی و آنتی‌اکسیدانی استیل ال‌کارنیتین در بررسی‌های قبلی به‌اثبات رسیده است. کاهش اکسیدان‌ها و افزایش آنتی‌اکسیدان‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اهداف بسیاری از مطالعات بوده است. مواد آنتی‌اکسیدان به صورت مستقیم با کاهش رادیکال‌های آزاد تا حدودی در تنظیم تعادل مواد آنتی‌اکسیدان-اکسیدان نقش دارند. سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن، آسیب ناشی

محمدرضا حاجی‌نژاد*

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

شقایق حاجیان شهری DVM

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

سمیرا سقایی DVM

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

علیرضا سامرزاده کرمانی PhD

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

رضا نبوی PhD

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

اهداف: امروزه گرایش به‌سوی داروهای جدید که عوارض جانبی کمتری دارند روزبه‌روز گسترش می‌یابد. مطالعات مختلف تاثیر ال‌کارنیتین و استیل ال‌کارنیتین را در کاهش عوارض ثانویه بیماری دیابت نوع اول نشان داده‌اند. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجویز خوارکی ال‌کارنیتین و استیل ال‌کارنیتین بر میزان گلوکز خون و پراکسیداسیون لیپیدی بافت مغز و کبد در رت‌های دیابتی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به بینج گروه؛ کنترل (موش‌های سالم)، کنترل منفی (موش‌های دیابتی) و سه گروه دیابتی تحت تیمار تقسیم شدند. گروه‌های دیابتی با تزریق ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم آلوکسان دیابتی شدند. گروه‌های تحت تیمار، هر کدام به ترتیب ال‌کارنیتین، استیل ال‌کارنیتین به‌همراه استیل ال‌کارنیتین (بهمیزان ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) را به صورت گوازه به‌مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. در پایان آزمایش، پراکسیداسیون لیپیدی، گلوکز سرم، پروفایل لیپیدی و آنزیمه‌های کبدی اندازه‌گیری شد. نتایج توسط آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و به‌دبال آن آزمون تکمیلی توکی تحیل شدند.

یافته‌ها: در گروه دیابتی تحت تیمار با ال‌کارنیتین در مقایسه با گروه دیابتی بدون درمان، به‌طور معنی‌داری غلظت گلوکز ناشای خون، تری‌گلیسرید، کلسیترول، کراتینین و آنزیمه‌های کبدی سرم، همچنین میزان مالون‌دی‌آلدید بافت کبد کاهش و میزان HDL افزایش یافت ($p < 0.05$). تجویز استیل ال‌کارنیتین سبب کاهش مالون‌دی‌آلدید بافت مغز و افزایش HDL سرم شد، اما بر سایر پارامترها اثر معنی‌دار نداشت. تجویز استیل ال‌کارنیتین همراه با ال‌کارنیتین، اثرات مثبت ال‌کارنیتین را کاهش داد.

نتیجه‌گیری: تجویز ال‌کارنیتین در مقایسه با استیل ال‌کارنیتین در کاهش عوارض ثانویه بیماری دیابت تاثیر بیشتری دارد. همچنین تجویز همزمان این دو ماده توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: دیابت، ال‌کارنیتین، استیل ال‌کارنیتین، موش صحرایی

از رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهد. کاهش کارکرد سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و افزایش تولید رادیکال‌های آزاد، شرایط را برای بروز استرس اکسیداتیو فراهم می‌کند^[6].

اندازه‌گیری میزان مالون دی‌آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. برخی از محققان معتقدند اندازه‌گیری میزان مالون دی‌آلدئید در سرم و بافت کبد می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های استرس اکسیداتیو استفاده شود^[7].

با توجه به خواص آنتی‌اکسیدانی ال-کارنیتین و استیل ال-کارنیتین، این مطالعه با هدف بررسی اثر تجویز خوارکی این دو ماده بر میزان گلوکز خون و پراکسیداسیون لیپیدی بافت مغز و کبد در رت‌های دیابتی انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی روی ۵۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۱۸۰-۲۰۰ گرم انجام شد. موش‌ها در مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در شرایط استاندارد قرار گرفتند. قفس نگهداری از جنس پلاستیک با دربوش پنجه‌های فلزی بود که در محل مخصوص قفس‌ها روی پایه نگهداری می‌شد. قفس‌ها هر ۴ روز یکبار تعویض و تمیز می‌شدند. حیوانات به آب و غذای مخصوص موش (شرکت جوانه خراسان؛ ایران) دسترسی داشتند. موش‌ها به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند: (۱) گروه کنترل (موس‌های صحرایی سالم)، (۲) گروه کنترل منفی (موس‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان)، (۳) گروه دیابتی تحت تیمار با ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین، (۴) گروه دیابتی تحت تیمار با ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم استیل ال-کارنیتین و (۵) گروه دیابتی تحت تیمار با ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم استیل ال-کارنیتین به همراه ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین.

محلول‌ها به مدت ۳۰ روز به موش‌ها خورانده شدند. برای تهییه محلول‌های ال-کارنیتین و استیل ال-کارنیتین از سرم فیزیولوژی استفاده شد. به موش‌های گروه کنترل، سرم فیزیولوژی با استفاده از سرنگ مخصوص گواژ خورانده شد. دوز محلول‌ها براساس مطالعات قبلی و بررسی‌های اولیه انتخاب شد^[8,9].

روش القای دیابت تجربی در موش‌ها: مدل تجربی دیابت قندی نوع اول (دیابت واپسنه به انسولین) در موش صحرایی نر با تزریق درون‌صفاقی آلوکسان ایجاد شد. پودر آلوکسان (سیگما؛ ایالات متحده) در آب مقطّر حل شد. محلول تهییه شده به‌وسیله سرنگ انسولین با دوز ۱۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل‌صفاقی تزریق شد. عالیم دیابت شامل پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن پس از گذشت ۳ روز ظاهر شد. برای اطمینان از دیابتی‌شدن رت‌ها میزان قند خون آنها پس از خون‌گیری از دم و توسط دستگاه گلوکومتر کنترل شد. در صورتی که سطح گلوکز

ناشتاوی خون آنها بیشتر از ۱۴۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود، به عنوان موش‌های دیابتی در نظر گرفته شدند و در غیر این صورت عمل تزریق باقیستی تکرار می‌شد^[10]. در پایان دوره آزمایش از قلب موش‌ها خون‌گیری شد و مقادیر قند خون و پارامترهای بیوشیمیایی سرم اندازه‌گیری شد.

برای به دست آوردن مقادیر سرمی کلسترول توتال، تری‌گلیسرید، HDL-C (لیپوپروتئین با چگالی بالا) و کراتینین سرم از کیت‌های بیوشیمیایی (پارس‌آزمون؛ ایران) با توجه به دستورالعمل آنها استفاده شد. اندازه‌گیری کلسترول و تری‌گلیسرید به روش آنزیمی انجام شد. به منظور اندازه‌گیری HDL-SRM از محلول رسوب‌دهنده حاوی آنتی‌بادی خدیلی‌لیپوپروتئین انسانی برای رسوب‌دادن شیلومیکرون، LDL-C (لیپوپروتئین با چگالی پایین) و VLDL-C با چگالی بسیار پایین استفاده شد. سپس میزان کمپلکس آرینگ ایجاد شده در نتیجه ترکیب ۴-آمینو‌آنتی‌بیرین و HDL-C با استفاده از دستگاه اتو‌آنالایزر Selectra pro M (هلند) مورد سنجش قرار گرفت^[11]. میزان گلوکز سرم موش‌های ناشتاوی، در زمان صفر (زمان شروع آزمایش) با استفاده از گلوکومتر و در پایان آزمایش توسط کیت بیوشیمی (پارس‌آزمون؛ ایران) اندازه‌گیری شد.

آنژیم‌های ALT (آلانین‌آمینو‌ترنسفراز) و AST (آسپارتات‌آمینو‌ترنسفراز) نیز با استفاده از دستگاه اتو‌آنالایزر Selectra pro M (هلند) و براساس دستورالعمل کیت‌های آنزیمی (پارس‌آزمون؛ ایران) مورد سنجش قرار گرفتند.

اندازه‌گیری سطح بافتی مالون دی‌آلدئید (MDA): در پایان آزمایش و پس از آسان‌کشی (کشن حیوان با رعایت اخلاقی)، نمونه‌های کبد و مغز جدا و پس از شستشو با سالین سرد، وزن هر نمونه اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها همراه با بافر تریس هموژیزه شدن و محلول هموژیزه شده سانتریفیوز شد. برای جلوگیری از تخرب پروتئین‌ها و آنزیم‌ها تمام مراحل ذکر شده در دمای ۴°C و در سردخانه دانشکده دامپزشکی زابل انجام شد. پس از پایان مرحله سانتریفیوز، محلول شفاف بالایی با استفاده از پیپت از بقیه محلول جدا شده و قسمت پایینی محلول دور ریخته شد. برای سنجش میزان مالون دی‌آلدئید بافتی از محلول شفاف بالایی استفاده شد. اندازه‌گیری سطح بافتی مالون دی‌آلدئید به‌وسیله تعیین مقدار مواد واکنش‌دهنده با تیوباربیتوئریک‌اسید و دستورالعمل کیت (ازنام شیمی؛ ایران) انجام گرفت. اساس این کیت، اندازه‌گیری MDA به‌وسیله تیوباربیتوئریک با استفاده از اسپکتروفوتومتر است که توسط او کاوا در سال ۱۹۹۷ شرح داده شد^[12]. براساس دستورالعمل کیت، ۱۰۰ میکرولیتر از بافت هموژیزه آب قطره دیونیزه و سدیم کلرید ۰/۹٪ (به نسبت حجمی یک:یک:یک) داخل لوله آزمایش ریخته شد. لوله آزمایش به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۳۷°C نگهداری شد. سپس با استفاده از یک‌میلی‌لیتر اسید کلریدریک ۸/۰۰ مولار که حاوی اسیدتری‌کلرواستیک ۱۲٪ است واکنش موقوف

تری‌گلیسرید و کلسترول خون نداشت، اما میزان HDL را به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه دیابتی بدون درمان افزایش داد (p<0.001).

تجویز آل کاربین، میزان کراتینین سرم را در مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش داد (p<0.05). در مقابل، استیل آل کاربین اثر بارزی بر کاربین نداشت.

تیمار موش‌های دیابتی با آل کاربین، میزان آنزیمه‌های کبدی را در مقایسه با گروه دیابتی بدون درمان کاهش داد، اما توانست میزان این آنزیمه‌ها را به حد گروه کنترل برساند. میزان آنزیمه‌های کبدی در گروه تحت تیمار با استیل آل کاربین تفاوت معنی‌دار با گروه دیابتی بدون درمان نداشت. میزان آنزیمه‌های کبدی در گروه دریافت‌کننده استیل آل کاربین همزمان با آل کاربین، از گروه تحت تیمار با آل کاربین بهتری بیشتر بود (p<0.05).

تجویز استیل آل کاربین، میزان مالون‌دی‌آلدیید بافت مغز را به طور معنی‌داری نسبت به گروه دیابتی بدون تیمار کاهش داد (p<0.05)، اما بر مالون‌دی‌آلدیید بافت کبد تاثیر معنی‌دار نداشت. آل کاربین اثر معنی‌داری بر پراکسیداسیون لیپیدی بافت مغز نداشت، اما میزان مالون‌دی‌آلدیید بافت کبد را کاهش داد. تجویز همزمان آل کاربین و استیل آل کاربین نه تنها سبب تقویت اثر دو ماده نشد، بلکه میزان مالون‌دی‌آلدیید بافتی را به میزان کمتر نسبت به تجویز هر کدام از مواد بهتری کاهش داد (جدول ۱).

شده. پس از اضافه کردن یکسی‌سی محلول تیوباریتوريکا سید ۱٪، محلول به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و در دمای اتاق سرد شد. محلول سردشده به مدت ۳۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. جذب نوری محلول در طول موج ۵۳۲ نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل 2100 UV/VIS (UNICO): ایالات متحده) مورد سنجش قرار گرفت [۱۲].

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها: تمام نتایج به صورت میانگین آماری بیان شد. نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. برای مقایسه گروه‌ها با یکدیگر، آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و به دنبال آن آزمون تکمیلی توکی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

غلظت گلوکز ناشتاپ سرم خون در پایان ۳۰ روز در گروه دیابتی تحت تیمار با آل کاربین به طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل منفی (گروه دیابتی بدون درمان) کاهش یافت (p<0.05). در گروه دیابتی تحت تیمار با آل کاربین، میزان تری‌گلیسرید و کلسترول سرم به طور معنی‌دار از گروه دیابتی بدون درمان کمتر بود (p<0.001). آل کاربین توانست میزان HDL را نسبت به گروه کنترل منفی به طور معنی‌دار افزایش دهد (p<0.001). تیمار رت‌های دیابتی با استیل آل کاربین اثر معنی‌داری بر میزان

جدول ۱ مقایسه غلظت گلوکز ناشتاپ، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و میزان مالون‌دی‌آلدیید بافت مغز و کبد موش‌های صحرایی در گروه‌های آزمایشی
(تعداد در هر گروه = ۱۰ سر)

متغیرهای مورد بررسی					
غلظت سرمی گلوگز (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)					
استیل آل کاربین	گروه دیابتی+ استیل آل کاربین	گروه دیابتی+ آل کاربین	گروه دیابتی بدون درمان	گروه کنترل درمان	گروه دیابتی بدون درمان
۸۴/۵۴±۵/۰۱	۹۰/۲۱±۵/۲۱	۸۸/۰۹±۶/۳۱	۸۴/۴۱±۴/۷۱	۸۸/۵۰±۴/۳۹	در روز صفر
۲۰۶/۸۰±۱۴/۴۳	۱۹۸/۴۳±۹/۱۳	۱۴۹/۳۳±۶/۱۲	۲۰۱/۳۲±۴/۲۳	۹۲/۱۷±۴/۱۰	در روز ۳۰
پارامترهای بیوشیمیایی سرم					
۱۴۷/۱۲±۱۱/۳۱	۱۳۷/۰۸±۷/۲۰	۹۶/۰۲±۵/۱۶	۱۳۸/۸۰±۵/۰۶	۹۱/۵۰±۷/۵۴	کلسترول (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)
۱۷۹/۴۰±۱۲/۰۶	۱۸۸/۶۰±۷/۱۱	۱۱۷/۵۰±۴/۱۶	۱۹۱/۲۲±۱۷/۱۰	۱۱۰/۲۰±۸/۰۲	تری‌گلیسرید (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)
۱۲/۲۱±۳/۴۳	۲۷/۹۶±۵/۲۰	۲۵/۸۴±۳/۹۸	۶/۸۰±۱۸/۹	۳۸/۵۰±۳/۷۴	HDL-C (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)
۱۹۹/۵۰±۱۳/۰۰	۱۹۸/۱۰±۸/۶۲	۱۶۷/۳۰±۵/۱۶	۲۱۱/۳۰±۱۵/۱۴	۱۰۱/۲۰±۵/۱۰	AST (واحد بر لیتر)
۲۴۲/۳۰±۱۳/۰۹	۲۲۴/۷۰±۱۱/۳۰	۱۶۸/۸۰±۸/۰۰	۲۵۴/۴۰±۶/۰۰	۱۳۱/۰۰±۵/۳۲	ALT (واحد بر لیتر)
۱/۵۰±۰/۳۱	۱/۵۴±۰/۲۷	۱/۶۰±۰/۱۸	۲/۱۴±۰/۴۲	۱/۵۱±۰/۳۱	کاربین (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)
میزان مالون‌دی‌آلدیید (نانومول بر میلی‌گرم بافت)					
۱۲/۴۱±۱/۰۶	۹/۴۰±۱/۵۴	۱۲/۲۰±۰/۸۴	۱۳/۴۰±۱/۰۴	۸/۶۰±۰/۷۰	در بافت مغز
۷/۸۰±۱/۰۰	۷/۲۰±۰/۷۰	۵/۱۰±۰/۳۰	۸/۶۰±۰/۷۰	۵/۶۰±۰/۱۰	در بافت کبد

ATP است. این ماده با افزایش انتشار تسهیل شده گلوکز به درون

سلول و فعال کردن برخی آنزیمه‌های مسیر گلیکولیز نقش مهمی در کاهش قند خون دارد [۱۳، ۱۴]. در بررسی حاضر، تجویز استیل آل کاربین اثر معنی‌داری بر میزان قند خون نداشت. تجویز

بحث

نتایج این بررسی نشان داد آل کاربین اثر معنی‌داری بر کاهش قند خون رت‌های دیابتی داشته است. نقش اصلی آل کاربین در میتوکندری تسریع فرآیند اکسیداسیون اسیدهای چرب برای تولید

بررسی بیوشیمیایی نشان داد میزان تشکیل رادیکالهای آزاد و آسیب میتوکندریال ناحیه هیپوکمپ در رتهای درمان شده با ال کارنیتین به طور معنی داری کمتر از گروه بدون تیمار بود^[23].

در بررسی حاضر، میزان مالون دی‌آلدئید بافت مغز در گروه تیمار شده با استیل ال کارنیتین به طور معنی داری کمتر از گروه دیابتی بدون تیمار بود. این یافته با نتایج مطالعه لیو و همکاران^[16] و کاور و همکاران^[24] همسو است. به نظر می‌رسد افزایش انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری و کاهش اسیدهای چرب در معرض پراکسیداسیون، دلیل اصلی کاهش مالون دی‌آلدئید مغز باشد. تجویز خوراکی استیل ال کارنیتین توانست استرس اکسیداتیو را در مدل تجربی آنژایمر کاهش دهد. همچنین اثر ضدصرعی این ماده در مدل تشنج عمومی ایقاشه با پنتنیل ترازاول مشخص شده است. اثر حفاظت عصبی و آنتی‌اکسیدانی استیل ال کارنیتین در بررسی‌های قبلی به اثبات رسیده است. استیل ال کارنیتین می‌تواند به آسانی از سد خونی مغزی رد شود. برخی پژوهش‌ها نشان داده است که این ماده می‌تواند به عنوان یک آنتی‌اکسیدان مهم در رژیمهای غذایی استفاده شود. تجویز استیل ال کارنیتین سبب افزایش میزان میتوکندری‌های کبد و افزایش فعالیت آنزیم‌های کبد در موش‌های هیپرلیپیدمیک شد، اما تاثیری بر تجمع چربی در بافت کبد موش‌های هیپرلیپیدمیک نداشت^[25].

در مطالعه ما تجویز استیل ال کارنیتین تاثیر معنی داری بر پراکسیداسیون لیپیدی بافت کبد نداشت. استیل ال کارنیتین توانست میزان آنزیم‌ها را در پایان دوره آزمایش به طور معنی دار کاهش دهد. بر عکس، تحقیقات قبلی نشان داد تجویز طولانی مدت استیل ال کارنیتین به رتهای مبتلا به کبد چرب میزان آنزیم‌های کبدی را به طور چشمگیر کاهش می‌دهد. دلیل اصلی تفاوت نتایج این دو مطالعه به دوره زمانی تجویز استیل ال کارنیتین مربوط است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده دوره تجویز استیل ال کارنیتین افزایش باید و همچنین اثر پیشگیری کننده استیل ال کارنیتین بررسی شود.

در مطالعات پیشین تجویز داخل صفاقی ال کارنیتین با دوز ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت ۲ روز میزان کراتینین سرم را در رتهای مبتلا به نارسایی حاد کلیوی تا حد نرمال کاهش داد. به طوری که میزان کراتینین گروه تحت تیمار با گروه کنترل اختلاف معنی دار نداشت^[26]. در مطالعه حاضر تجویز خوراکی ال کارنیتین میزان کراتینین را نسبت به گروه دیابتی بدون درمان کاهش داد. به نظر می‌رسد افزایش دوز دارو و همچنین مدت زمان آزمایش تاثیر مثبت ال کارنیتین را در بهبود پارامترهای بیوشیمیایی و پراکسیداسیون لیپیدی تقویت می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در بررسی‌های آینده از دوز بالای ال کارنیتین استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در بررسی‌های بعدی مدت زمان تجویز ال کارنیتین

_____ مقایسه اثر حفاظتی ال-کارنیتین و استیل ال-کارنیتین بر سطح گلوكز سرم و پراکسیداسیون لیپیدی در موش‌های صحرابی دیابتی ۲۳۳
ال کارنیتین همراه با استیل ال کارنیتین، قند خون و مالون دی‌آلدئید بافت کبد را به میزان کمتر (در مقایسه با تجویز ال کارنیتین به تنهایی) کاهش داد. احتمالاً تجویز همزمان این دو ماده سبب کاهش جذب هر دو از دستگاه گوارش و اختلال در عملکرد آنها می‌شود، هر چند اثبات این مسئله نیازمند تحقیقات بیشتر است.

در مطالعه حاضر تجویز ال کارنیتین (۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) توانست میزان مالون دی‌آلدئید بافت کبد را به عنوان شخص مهم پراکسیداسیون لیپیدی به طور معنی دار کاهش دهد که با نتایج مطالعه محفوظ و همکاران مشابه است^[15]. کاهش مالون دی‌آلدئید بافت کبد در گروه تیمار شده با ال کارنیتین می‌تواند به علت نقش ال کارنیتین در انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری برای تولید انرژی باشد. تجویز خوراکی ال کارنیتین، اثر بارزی بر میزان مالون دی‌آلدئید بافت مغز نداشت که با نتایج لیو و همکاران^[16] همسو و با نتایج تحقیق ماقاری و همکاران^[17] ناهمسو بود. به تازگی اثر ال کارنیتین بر کاهش آسیب بافت عضلانی و جلوگیری از استرس اکسیداتیو بافت عضله در مطالعات "در شیشه" بررسی شده است. مواجهه بافت عضلانی با ال کارنیتین سبب تسريع فرآیند هیبرتروفی سلول‌های ماهیچه، افزایش تولید ATP در میتوکندری‌ها و کاهش شاخص‌های مرتبط با استرس اکسیداتیو بافت عضله می‌شود^[18]. همچنین تجویز خوراکی ال کارنیتین با دوز ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم میزان آسیب عضلانی ناشی از تتراکلورکربن را در بافت عضله رتهای سالم کاهش داد^[19]. افزایش HDL همراه با کاهش تری‌گلیسرید و کلسترول سرم نشان‌دهنده اثرات مثبت ال کارنیتین بر پروفایل لیپیدی است. علاوه بر این، میزان آنزیم‌های کبدی در گروه تیمار شده با ال کارنیتین کاهش معنی داری داشت که تایید کننده نتایج مطالعات قبلی بود^[20]. در گروهی که ال کارنیتین و استیل ال کارنیتین را همزمان دریافت کرده بودند، افزایش معنی داری در میزان کراتینین و آنزیم‌های کبدی نسبت به گروه دیابتی بدون درمان وجود نداشت. با توجه به این نتایج به نظر می‌رسد تجویز همزمان ال کارنیتین و استیل ال کارنیتین اثر توکسیک ندارد.

در بررسی حاضر، تیمار گروه دیابتی با استیل ال کارنیتین HDL سرم را به طور معنی دار افزایش داد. کاهش پاکسازی HDL و افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز می‌تواند دلیل این اثر باشد^[22]. مطالعات کاززو و همکاران نشان داده است تجویز ال کارنیتین می‌تواند آسیب مغزی ناشی از هیپوگلیسمی را در موش صحرابی کاهش دهد. در یک بررسی موش‌های صحرابی به مدت یک هفته تحت تیمار با انسولین قرار گرفتند و سپس به مدت دو هفته به آب آشامیدنی آنها ۱٪ ال کارنیتین اضافه شد. نتایج بررسی نشان داد تجویز ال کارنیتین سبب بهبود حافظه فضایی و کاهش رفتار اضطرابی در رتهای هیپوگلیسمیک شد، هر چند که تاثیری بر ادم مغزی و مرگ‌ومیر موش‌های هیپوگلیسمیک نداشت. همچنین

و استیل ال کارنیتین افزایش یابد و میزان هموگلوبین گلیکه اندازه‌گیری شود.

از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به عدم ارزیابی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کبد مانند سوپراکسیدیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون‌پراکسیداز اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود در طرح‌های مشابه آتی، ساختارهای مرتبط با استرس اکسیداتیو در سرم و بافت‌های کبد و مغز بررسی شود.

نتیجه‌گیری

تجویز ال کارنیتین در مقایسه با استیل ال کارنیتین در کاهش عوارض ثانویه بیماری دیابت تاثیر بیشتری دارد. همچنین تجویز همزمان این دو ماده توصیه نمی‌شود.

تشکر و قدردانی: از همکاری آقای مهدی میرشکار برای انجام محاسبه‌های آماری و آقای محمود صالحی مقدم مسئول مرکز پژوهش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه زابل تشکر می‌شود.

تاییدیه اخلاقی: پروتکل این پژوهش براساس قوانین بین‌المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی و سند مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی تصویب شد و به انجام رسید (شماره سند: .BP-QP-106-01)

تعارض منافع: هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.

منابع مالی: این مطالعه براساس پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای خانم شفایق حاجیان شهری و با هزینه گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل انجام گرفت.

منابع

- diabetes and its complications. *Biomed Pharmacother.* 2005;59(7):365-73.
- 7- Chen J, Zeng L, Xia T, Li S, Yan T, Wu S, et al. Toward a biomarker of oxidative stress: A fluorescent probe for exogenous and endogenous malondialdehyde in living cells. *Anal Chem.* 2015;87(16):8052-6.
- 8- Shaker ME, Houssen M, Abo-Hashem EM, Ibrahim TM. Comparison of vitamin E, L-carnitine and melatonin in ameliorating carbon tetrachloride and diabetes induced hepatic oxidative stress. *J Physiol Biochem.* 2009;65(3):225-33.
- 9- Petruzzella V, Baggetto LG, Penin F, Cafagna F, Ruggiero FM, Cantatore P, et al. In vivo effect of acetyl-L-carnitine on succinate oxidation, adenine nucleotide pool and lipid composition of synaptic and non-synaptic mitochondria from cerebral hemispheres of senescent rats. *Arch Gerontol Geriatr.* 1992;14(2):131-44.
- 10- Hajinezhad MR, Davari SA, Esmaeel Zadeh S, Miri HR, Akbari M. Protective effect of hydro alcoholic extract from *Prosopis farcta* leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats. *J North Khorasan Univ Med Sci.* 2015;7(2):267-78. [Persian]
- 11- Ashraf H, Heydari R, Nejati V, Ilkhanipoor M. Preventive effect of berberis integerrima on the serum levels of glucose and lipids in streptozotocin (STZ)-induced diabetes in rats. *J Fasa Univ Med Sci.* 2012;2(3):148-55. [Persian]
- 12- Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. *Anal Biochem.* 1979;95(2):351-8.
- 13- Hajinezhad MR, Esmaeel Zadeh Bahabadi S, Miri HR, Davari SA, Darvish Sargazi M. Effect of hydroalcoholic extract of *Prosopis farcta* pod on liver histopathology and malondialdehyde level in streptozotocin diabetic rats. *Horizon Med Sci.* 2015;21(1):31-6. [Persian]
- 14- Yano H, Oyanagi E, Kato Y, Samejima Y, Sasaki J, Utsumi K. L-carnitine is essential to beta-oxidation of quarried fatty acid from mitochondrial membrane by PLA(2). *Mol Cell Biochem.* 2010;342(1-2):95-100.
- 15- Mahfouz MH, Ghanem HM, Mohamed MA. Therapeutic effect of L-carnitine on sialic acid, soluble Fas (sFas) and other biochemical variables in hyperinsulinemic rats. *Life Sci J.* 2009;6(2):76-84.
- 16- Liu J, Head E, Kuratsune H, Cotman CW, Ames BN. Comparison of the effects of L-carnitine and acetyl-L-carnitine on carnitine levels, ambulatory activity, and oxidative stress biomarkers in the brain of old rats. *Ann NY Acad Sci.* 2004;1033:117-31.
- 17- Maccari F, Arseni P, Chiodi. Levels of carnitines in brain and other tissues of rats of different ages: effect of acetyl-L-carnitine administration. *Exp Gerontol.* 1990;25(2):127-34.
- 18- Nascimento MA, Higa E, de Mello MT, Tufik S, Oyama LM, Santos RV, et al. Effects of short-term l-arginine supplementation on lipid profile and inflammatory proteins after acute resistance exercise in overweight men. *Clin Nutr Espen.* 2014;9(3):141-5.
- 19- Ali SA, Faddah L, Abdel-Baky A, Bayoumi A. Protective effect of L-carnitine and coenzyme Q10 on CCl4-induced liver injury in rats. *Sci Pharm.* 2010;78(4):881-6.
- 20- Heo YR, Kang CW, Cha YS. L-Carnitine changes the levels of insulin-like growth factors (IGFs) and IGF binding proteins in streptozotocin-induced diabetic rat. *J Nutr Sci Vitaminol.* 2001;47(5):329-34.
- 21- Irat AM, Aktan F, Ozansoy G. Effects of L-carnitine treatment on oxidant/antioxidant state and vascular

- ۲۳۵ مقایسه اثر حفاظتی ال- کاربینین و استیل ال- کاربینین بر سطح گلوکز سرم و پراکسیداسیون لبیدی در موش های صحرایی دیابتی
- enhances Na⁽⁺⁾, K⁽⁺⁾-ATPase glutathione-S-transferase and multiple unit activity and reduces lipid peroxidation and lipofuscin concentration in aged rat brain regions. *Neurosci Lett.* 2001;301(1):1-4.
- 25- Kathirvel E, Morgan K, French SW, Morgan TR. Acetyl-L-carnitine and lipoic acid improve mitochondrial abnormalities and serum levels of liver enzymes in a mouse model of nonalcoholic fatty liver disease. *Nutr Res.* 2013;33(11):932-41.
- 26- Aydogdu N, Atmaca G, Yalcin O, Taskiran R, Tastekin E, Kaymak K. Protective effects of L-carnitine on myoglobinuric acute renal failure in rats. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2006;33(1-2):119-24.
- reactivity of streptozotocin-diabetic rat aorta. *J Pharm Pharmacol.* 2003;55(10):1389-95.
- 22- Fernandez I, Tonietti M, Camberos MDC, Bergada I, Schenone A, et al. Acetyl-L-Carnitine and nicotinamide for prevention of type 1 diabetes, I-literature review which gave support to the treatment, II-case report, evaluation of five years treatment. *Immunome Res.* 2015;11(2):094.
- 23- Hino K, Nishikawa M, Sato E, Inoue M. L-carnitine inhibits hypoglycemia-induced brain damage in the rat. *Brain Res.* 2005;1053(1-2):77-87.
- 24- Kaur J, Sharma D, Singh R. Acetyl-L-carnitine